

“Les plantes vous font savoir qu’elles sont prêtes à fleurir dès que le pH tombe dans les environs de 5,2”



CANNA
AQUA
Jeff:
Alpiniste
& Grower

	lumière par jour HEURES	Aqua Vega A+B ml A/10L ml B/10L	Aqua Flores A+B ml A/10L ml B/10L	RHIZOTONIC ml/10L	CANNAZYM ml/10L	CANNABOOST ml/10L	PK 13/14 ml/10L	EC ¹
CROISSANCE	Formation des racines - Durée +/- 1 semaine	18	15 - 20	-	40	-	-	0.9 - 1.2 ¹
	Phase végétative - Durée +/- 1 à 3 semaines Croissance rapide	18/12 ³	20 - 25	-	10	25	-	1.2 - 1.5 ¹
FLORAISON	Phase génératrice 1 - Durée +/- 1 à 2 semaines Premiers signes de formation de pistils de fruits	12	-	25 - 35	5	25	20 - 40 ²	1.3 - 1.8 ¹
	Phase génératrice 2 - Durée +/- 1 semaine Petits fruits se développent	12	-	20 - 30	5	25	20 - 40 ²	1.4 - 1.9 ¹
	Phase génératrice 3 - Durée +/- 2 à 3 semaines Génératrice fruits grandissent en taille	12	-	22 - 30	5	25	20 - 40 ²	1.1 - 1.5 ¹
	Phase génératrice 4 - Durée +/- 1 à 2 semaines Fruits grandissent en taille et mûrissent	12	-	15 - 25	-	25	20 - 40 ²	0.8 - 1.3 ¹

1. Mesuré en mS/cm dans de l'eau dont la EC est 0,0 à 25°C. Assurez-vous d'ajouter la valeur EC de votre eau à la valeur recommandée! Ajustez le pH afin d'obtenir une valeur entre 5,2 et 6,2.

2. Standard 20ml/10L, pour plus stimulation de floraison: 40ml/10L

3. Le moment idéal pour changer la photopériode de 18 à 12 heures dépend de l'espèce cultivée. En général, 2 semaines sont suffisantes.

Les directives indiquées dans le tableau ne sont pas contraignantes, mais elles peuvent aider les cultivateurs débutants à développer une stratégie de fumage bien calculée, basée sur la connaissance et l'expérience. La stratégie de fumage optimale est en outre déterminée par des facteurs tels que la température, l'humidité atmosphérique, le genre de plante, le volume de racines, l'EC de l'eau du robinet, le pourcentage d'humidité dans le sous-sol ainsi que la technique d'irrigation. La EC de l'eau de robinet dans un système hydroponique devrait idéalement être entre 0,2 et 0,6 mS/cm.

“il est impossible
d'améliorer un
résultat parfait”



Bob:
Kitesurfer
& Grower

	lumière par jour HEURES	COCO A & B ml A/10L ml B/10L	RHIZOTONIC ml/10L	CANNAZYM ml/10L	CANNABOOST ml/10L	PK 13/14 ml/10L	EC ¹ ml/10L
CROISSANCE	Formation des racines - Durée +/- 1 semaine	18	15 - 20	40	-	-	0.8 - 1.0 ¹
	Phase végétative - Durée +/- 1 à 3 semaines Croissance rapide	18/12 ³	20 - 30	20	25	-	1.0 - 1.5 ¹
FLORAISON	Phase génératrice 1 - Durée +/- 1 à 2 semaines Premiers signes de formation de pistils de fruits	12	25 - 40	5	25	20 - 40 ²	1.3 - 2.0 ¹
	Phase génératrice 2 - Durée +/- 1 semaine Petits fruits se développent	12	20 - 35	5	25	20 - 40 ²	1.3 - 2.1 ¹
	Phase génératrice 3 - Durée +/- 2 à 3 semaines Génératrice fruits grandissent en taille	12	20 - 35	5	25	20 - 40 ²	1.0 - 1.8 ¹
	Phase génératrice 4 - Durée +/- 1 à 2 semaines Fruits grandissent en taille et mûrissent	12	-	-	25	20 - 40 ²	0.0 ¹

1. Assurez-vous d'ajouter la valeur EC de votre eau à la valeur recommandée! Ajustez le pH afin d'obtenir une valeur entre 5.5 et 6.2.

2. Standard 20ml/10L, pour plus stimulation de floraison: 40ml/10L

3. Le moment idéal pour changer la photopériode de 18 à 12 heures dépend de l'espèce cultivée. En général, 2 semaines sont suffisantes.

Les directives indiquées dans le tableau ne sont pas contraignantes, mais elles peuvent aider les cultivateurs débutants à développer une stratégie de fumage bien calculée, basée sur la connaissance et l'expérience. La stratégie de fumage optimale est en outre déterminée par des facteurs tels que la température, l'humidité atmosphérique, le genre de plante, le volume de racines, EC l'eau du robinet, le pourcentage d'humidité dans le sous-sol ainsi que la technique d'irrigation.

Si vous voulez créer un tableau sur-mesure, rendez vous sur le site www.canna.fr / calculateur de nutriment.



		lumière par jour	Terra Vega	Terra Flores	RHIZOTONIC	CANNAZYM	CANNABOOST	PK 13/14	EC ¹
		HEURES	ml/10L	ml/10L	ml/10L	ml/10L	ml/10L	ml/10L	
CROISSANCE	Formation des racines - Durée +/- 1 semaine	18	10 - 30	-	40	-	-	-	0.3 - 0.8 ¹
	Phase végétative - Durée +/- 1 à 3 semaines Croissance rapide	18/12 ³	30 - 50	-	20	25	-	-	0.8 - 1.4 ¹
FLORAISON	Phase génératrice 1 - Durée +/- 1 à 2 semaines Premiers signes de formation de pistils de fruits	12	-	40 - 60	5	25	20 - 40 ²	-	1.0 - 1.5 ¹
	Phase génératrice 2 - Durée +/- 1 semaine Petits fruits se développent	12	-	40 - 60	5	25	20 - 40 ²	15	1.0 - 1.5 ¹
	Phase génératrice 3 - Durée +/- 2 à 3 semaines Génératrice fruits grandissent en taille	12	-	40 - 60	5	25	20 - 40 ²	-	1.0 - 1.5 ¹
	Phase génératrice 4 - Durée +/- 1 à 2 semaines Fruits grandissent en taille et mûrissent	12	-	-	-	25	20 - 40 ²	-	0 ¹

1. Le moment idéal pour changer la photopériode de 18 à 12 heures dépend de l'espèce cultivée. En général, 2 semaines sont suffisantes.

2. standard 20ml/10L, pour plus stimulation de floraison: 40ml/10L

3. Mesuré en mS/cm dans de l'eau dont la EC est 0,0 à 25°C. Assurez -vous d'ajouter la valeur EC de votre eau à la valeur recommandée!

Les directives indiquées dans le tableau ne sont pas contraignantes, mais elles peuvent aider les cultivateurs débutants à développer une stratégie de fumage bien calculée, basée sur la connaissance et l'expérience. La stratégie de fumage optimale est en outre déterminée par des facteurs tels que la température, l'humidité atmosphérique, le genre de plante, le volume de racines, EC l'eau du robinet, le pourcentage d'humidité dans le sous-sol ainsi que la technique d'irrigation.

Si vous voulez créer un tableau sur- mesure, rendez vous sur le site www.canna.fr / calculateur de nutriment.



Canna Hydro

Hydro Vega

Hydro Flores

Rhizotonic

Cannazym

Canna boost

PK 13/14

valeur EC

formation des racines +/- 1 semaine	18 h croissance	1,2 à 2 ml / L		4 ml / L				0,5 - 1,0
phase végétative 1 à 3 semaines	12 heures floraison	2 à 3 ml / L		1 à 2 ml / L	2,5 ml / L			1,0 - 1,5
phase génératrice 1 : 1 à 2 semaines			2,5 à 3,5 ml / L	5 ml / L	2,5 ml / L	2 à 4 ml / L		1,2 - 1,7
phase génératrice 2 : +/- 1 semaine			2 à 3 ml / L	5 ml / L	2,5 ml / L	2 à 4 ml / L	1,5 ml / L	1,3 - 1,8
phase génératrice 3 : 2 à 3 semaines			2 à 3 ml / L	5 ml / L	2,5 ml / L	2 à 4 ml / L		1,0 - 1,5
phase génératrice 4 +/- 2 semaines					2,5 ml / L	2 à 4 ml / L		0,0

BIOCANNA

The Bio Solution for growth and bloom



		Lumière (heures/ jour)	Bio Vega ml/10L	Bio Flores ml/10L	BIORHIZOTONIC ml/10L	BIOBOOST ml/10L
CROISSANCE	Formation des racines - 1 semaines	18	10 - 20	-	40	-
	Phase végétative - 1 - 3 semaines Croissance rapide	18/12 ²	20 - 30	-	10 - 20	-
FLORAISON	Phase génératrice 1 - 1 - 2 semaines Croissance stagnante premiers signes de formation de pistils de fruits	12	-	30 - 40	5	40
	Phase génératrice 2 - 2 - 6 semaines Fruits grandissent en taille	12	-	30 - 40	5	20 - 40 ¹
	Phase génératrice 3 - 1 - 2 semaines Grandissent en taille et mûrissent	12	-	-	-	20 - 40 ¹

1. Standard 20ml/10L, pour plus stimulation de floraison: 40ml/10L

2. Le moment idéal pour changer la photopériode de 18 à 12 heures dépend de l'espèce cultivée. En général, 2 semaines sont suffisantes.

La mesure du pH et/ou de la EC est inutile pour la culture biologique. Usage de BIOCANNA nutriments est non-recommandé avec terreau inertes sans charge nutritive et sans contrôle de pH à long term. Nous recommandons l'usage du terreau Bio Terra Plus avec les engrais BIOCANNA.

Les directives indiquées dans le tableau ne sont pas contraignantes, mais elles peuvent aider les cultivateurs débutants à développer une stratégie de fumage bien calculée, basée sur la connaissance et l'expérience. La stratégie de fumage optimale est en outre déterminée par des facteurs tels que la température, l'humidité atmosphérique, le genre de plante, le volume de racines, EC l'eau du robinet, le pourcentage d'humidité dans le sous-sol ainsi que la technique d'irrigation.

Si vous voulez créer un tableau sur- mesure, rendez vous sur le site www.biocanna.fr / calculateur de nutriment.